



Die Lendenwirbelsäule

Bei Subluxation eines Wirbelkörpers bestehen folgende Zusammenhänge:

Subluxation (=Fehlstellung, Fixierung, Nervenirritation)

L = lumbal = Lendenwirbelsäule

Versorgungsbereich L1:

Unterbauch, Leiste

Auswirkungen: Einige Arten von „chronische“ Blinddarmentzündung, ziehende Schmerzen in einer oder beiden Leistenregionen

Versorgungsbereich L2:

Appendix, Bauch, Oberschenkel

Auswirkungen: Chronische Blinddarmentzündung, Unterbauchkrämpfe, Krampfadern

Versorgungsbereich L3:

Geschlechtsorgane, Hoden, Gebärmutter, Blase, Hüftgelenk und Knie

Auswirkungen: „Frauenleiden“ fehlende oder schmerzhafte Perioden, Fehlgeburten, unerfüllter Kinderwunsch, Impotenz, Bettnässen, Hüft- und Kniebeschwerden

Versorgungsbereich L4:

Colon, Prostata, Ischias

Auswirkungen: Verstopfungen, Probleme beim Wasserlassen, Ischias und Hexenschuss

Versorgungsbereich L5:

Uterus, Prostata, Blase, Füße, Unterschenkel, Ischias, Iliosacralgelenk (ISG)


Auswirkungen: Siehe auch L3-L4, geschwollene Knöchel, kalte Füße, Schmerzen im Iliosacral-Bereich

S = Sacrum = Kreuzbein

Versorgungsbereich S1-4:

Hüften, Gesäß

Auswirkungen: Statikprobleme, Becken- und Hüftgelenkschmerzen, starker Einfluss auf das ISG



Ein Organ wird immer aus mehreren Etagen versorgt.
Diese Angaben beziehen sich auf Erfahrungswerte !

